

# **FICHA TÉCNICA**

Ed. 1 (Abril 2019)

# **CATHEJELL CON LIDOCAÍNA**



Referencia	Código Nacional	Presentación	EAN
308025	178237.3	Cajas de 25 unidades	8470001782373
		mono-dosis de 12,5 gramos	

# Descripción:

- ▲ Gel lubricante estéril.
- ▲ Embalaje estéril.
- Antiséptico y anestésico.
- ▲ De un solo uso.
- Jeringa en forma de acordeón lista para su uso.
  - o Instilación suave y controlada.
  - o No hay bloqueo del pistón, como en una jeringa estándar.
- Gel transparente 12,5g.
  - o Soluble al agua y transparente, para instilación intra-uretral.
- Aplicador con forma cónica.
  - o Suave, sin bordes afilados, atraumático.
  - o Diseño anatómico fácil instilación.

Página 1 de 3

NIF: A-08626418 Tel: +34 936 473 310 Fax: +34 936 593 878 email: corysan@corysan.es



## **FICHA TÉCNICA**

Ed. 1 (Abril 2019)

- Punta rompible.
  - o Facilidad para romperla y desprenderla.
  - Se rompe dentro del propio envase.
- Aplicación asegurada y efectiva.
- ▲ Ideal para la aplicación con una sola mano.
- Instilación gradual y suave.
- ▲ Compatible con el uso de instrumental metálico.
- Muy buena tolerancia.
- ▲ Esterilización mediante vapor de agua no produce restos de óxido de etileno. (Los residuos de óxido de etileno sobre el instrumental puede derivar en estenosis de la uretra).
- ▲ Compatible con todos los materiales utilizados en los procedimientos de instilación uretral, como látex, silicona o PVC.

#### Indicaciones:

- ▲ Para instilación dentro de la uretra antes de insertar una sonda o un instrumento médico.
- ▲ Utilización en pacientes, hombres y mujeres, de más de 2 años de edad.

## Composición:


- ▲ El gel contiene hidrocloruro de lidocaína que actúa como anestésico local y hidrocloruro de clorhexidina que tiene propiedades antisépticas.
- PH de 5.
- No graso, soluble en agua, incoloro, inodoro y sin ingredientes activos.
- No mancha.
- Sin látex.
- Termosensible.

NIF: A-08626418 Tel: +34 936 473 310 Fax: +34 936 593 878 email: corysan@corysan.es



## **FICHA TÉCNICA**

Ed. 1 (Abril 2019)





- 1.- Método para romper la punta.
- 2.- La inserción suave del catéter solamente se consigue si se llena previamente la uretra con el gel lubricante. Después de la instilación del gel, se debe esperar 5-10 minutos antes de introducir la sonda o cualquier instrumento médico es el tiempo necesario para que la lidocaína haga efecto. Está demostrado que, si se aplica el lubricante sobre la sonda o el instrumento, no se consigue el efecto deseado. El gel se elimina con el roce al insertar el dispositivo en la uretra.

#### Normativa:

▲ Producto Sanitario de Clase III. Cumple los requisitos esenciales establecidos en el Anexo II del Real Decreto 1591/2009, transposición de la Directiva Europea 93/42/CEE, modificada por la Directiva 2007/47/CE, por la que se regulan los Productos Sanitarios.

**(**€<sub>0124</sub>

NIF: A-08626418 Tel: +34 936 473 310 Fax: +34 936 593 878 email: corysan@corysan.es